

Yrkesträff ortopedingenjörer

agenda:

- 10:45-11:15 **Registerdata ortoser från 2013/förslag till förbättringar i fysiomanualen om ortoser**
(Fredrik Bergljung/Tina Andersson)
- 11:15-11:30 **mer om handortoser med CAD**
(Michael Ceder)
- 11:30-11:45 **mer om handortoser i silikon**
(Mikael Sparr)
- 11:45-12:00 **diskussion** (alla)
- 12:00-12:30 **AFO vid Achillesförlängning och att använda registerdata** (Line Lyskjaer)


Skillnader sedan sist:

Barn födda fr år 2000 (alla regioner)


- Ståskal 26---23% (fr 2009)
- Korsett 8,5--11% (fr 2010)
- AFO 54-53% (fr 2011)
 - Variationen regionvis består
 - Ståskal R 4-40%
 - Korsett R 5-22%
 - AFO R36-73%

Andel korsett/GMFCS


andel m korsett



Korrelerar andel korsetter med andel scolios hos barn f 2000--- GMFCS III-V?



Med eller utan ortos NE/GMFCS



Födda 2000-2013 (data fr 2013 protokoll)

FB/CPUP 2014

Ankle-foot orthoses in children with cerebral palsy: a cross sectional population based study of 2200 children

- Analys användning & resultat AFO ROM+funktion
- Kartläggning av AFO bl a ålder, GMFCS
- Jämförande kontrakturutveckling AFO-anv mellan 2011-2012

AFO in children with CP: a cross sectional population based study of 2200 children

- $\frac{1}{2}$ av barn m CP har AFO
- $\frac{3}{4}$ av funktionella AFO uppnådde mål
- $\frac{3}{4}$ av ROM AFO bibehåller/förbättrar rörlighet
 - Ingen statistisk skillnad i anv tid
 - Sämre ROM initialt=bättre resultat

<http://www.biomedcentral.com/1471-2474/15/327>

Andel av totala mängden ortoser på NE från rapporter 2013:

	ROM	Funktion
• AFO	68%	62%
• KAFO	4%	2%
• KO	4%	1%
• HO	2%	1%

Funktionella ortoser:

1. Förbättra gångförmåga
2. Förbättra balans/ge stabilitet
3. Underlätta träning
4. Annat

Andel funktionella AFO regionvis

