

## Bedömnings- och rapporteringsintervall för vuxna i CPUP

Vuxenformuläret kan användas tidigast från och med 16 års ålder och skall användas till alla från och med 19 års ålder. Mellan 16 och 18 års ålder är frivilligt att välja vuxen- eller barnformulären.

### Undersökningsformulär för vuxna

Undersökningsintervall baseras på personens GMFCS-nivå.

GMFCS I	Undersöks vid 18, 21, 24, 27, 30 års ålder, dvs. vart tredje år
GMFCS II	Undersöks vid 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 års ålder dvs. vart annat år
GMFCS III-V	Undersöks varje år

Det är naturligtvis fritt att rapportera tötare, och det kan vara lämpligt om man har en person som visar tecken till försämring eller då det är en betydligt lägre MACS nivå än GMFCS nivå.

### EQ 5D-5L

Används till de personer över 18 år som har förmåga att besvara frågorna

GMFCS I	Fylls i vart tredje år (samma intervall som undersökningen).
GMFCS II-V	Fylls i vart annat år

### FSS (Fatigue severity Scale)

Används till de personer över 18 år som har förmåga att besvara frågorna

GMFCS I	Fylls i vart tredje år (samma intervall som undersökningen).
GMFCS II-V	Fylls i vart annat år

### Fall

Det finns två formulär för fall som fylls i vid 30-års ålder och för de personer som svarar ja på screeningfrågor om fallförekomst eller fallrädsla i undersökningsformuläret. Short-FES-I är ett självskattningsformulär med 7 frågor om fallrädsla och Mini-BESTest är ett balanstest.

### Neuropediatrikformulär

Endast ett formulär per individ. Formuläret skall helst ha fyllts i snarast möjligt efter 4 års ålder. Komplettering kan ske efterhand i samma formulär.

### Höft- och ryggröntgen

Se separata PM

### OP-formulär

Rapporteras enligt regionala rutiner.