



## Bedömnings- och rapporteringsintervall för vuxna i CPUP

Undersökningsformulär för vuxna kan användas tidigast från 16 års ålder och skall användas till alla från och med 19 års ålder. Mellan 16 och 18 års ålder är frivilligt att välja vuxen- eller barnformulär.

Nedan anges åldrar och bedömningsintervall för samtliga formulär inom vuxenuppföljningen. Det är naturligtvis fritt att rapportera tätare tex. om någon visar tecken till försämring eller när något ändras i livssituation eller hälsotillstånd.

### Undersökningsformulär för vuxna

Undersökningsintervall baseras på personens GMFCS-nivå.

GMFCS I	Undersöks vid 18, 21, 24, 27, 30 års ålder, dvs. vart tredje år
GMFCS II	Undersöks vid 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 års ålder dvs. vart annat år
GMFCS III-V	Undersöks varje år

### FSS (Fatigue Severity Scale)

Används till de personer från 18 år som har förmåga att förstå och besvara frågorna.

GMFCS I	Samma intervall som undersökningen (18, 21, 24 år dvs. vart tredje år)
GMFCS II	Samma intervall som undersökningen (18, 20, 22 år dvs. vart annat år)
GMFCS III-V	Fylls i vart annat år (vid 18, 20, 22... års ålder)

### WHODAS 2.0 (World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0)

Formulär med 12 frågor används till alla personer från 18 år. Finns i 3 versioner självrapporterad, ombudsrapporterad eller intervjuadministrerad. Använd om möjligt självrapporterat formulär.

GMFCS I	Samma intervall som undersökningen (18, 21, 24 år dvs. vart tredje år)
GMFCS II	Samma intervall som undersökningen (18, 20, 22 år dvs. vart annat år)
GMFCS III-V	Fylls i vart annat år (vid 18, 20, 22... års ålder)

### Fall

Det finns två formulär för fall. De fylls i vid 30-års ålder och när någon svarar ”Ja” på screeningfrågor om fallförekomst eller fallrädsla i undersökningsformuläret.

- **Short-FES-I** är ett självskattningsformulär med 7 frågor om fallrädsla (GMFCS I-V)
- **Mini-BESTest** är ett balanstest (används för personer i GMFCS I-II)

### Ortosformulär

Fylls i av leg. arbetsterapeut eller leg. ortopedingenjör vid utprovning av ny ortos för övre-, nedre extremitet eller spinal ortos.

### Neuropediatrikformulär

Endast ett formulär per individ. Formuläret skall helst ha fyllts i av neuropediatriker snarast möjligt efter 4 års ålder. Komplettering kan ske efterhand i samma formulär.

### Höft- och ryggröntgen

Se separata PM.

### OP-formulär

Rapporteras enligt regionala rutiner.