



PM för rygguppföljning av vuxna med CP

Klinisk ryggbedömning sker via uppföljningsformuläret. Fysioterapeut graderar eventuell skolios som lätt/måttlig/uttalad och bedömer om skoliosen är korrigerbar eller ej.

Om nyupptäckt måttlig fixerad skolios eller om uttalad (redressibel eller fixerad) skolios ses remitteras för skoliosröntgen.

Undantag: patient som har associerade sjukdomar som kontraindicerar eventuell skoliosoperation.

Fortsatt uppföljning baserat på röntgensvar:

<20 graders Cobbvinkel

Fortsatt klinisk uppföljning. Ny röntgen om progress misstänks vid klinisk undersökning.

20-40 graders Cobbvinkel

Nyupptäckt skolios (1:a röntgen)	ny rtg om 2 år
Progress < 10 grader på 2 år	ny rtg om 4 år
Progress > 10 grader på 2 år	ny rtg om 2 år

> 40 graders Cobbvinkel

Avgör om patienten skall remitteras för operationsbedömning

Om operation ej är aktuellt nu, men eventuellt i framtiden:

Nyupptäckt skolios (1:a röntgen)	ny rtg om 1 år
Progress < 10 grader på 2 år	ny rtg om 2 år
Progress > 10 grader på 2 år	ny rtg om 1 år