



PM för rygguppföljning av vuxna med CP

Klinisk ryggbedömning sker via uppföljningsformuläret. Fysioterapeut graderar eventuell skolios som lätt/måttlig/uttalad och bedömer om skoliosen är korrigerbar eller ej.

Om nyupptäckt måttlig fixerad skolios eller om uttalad (redressibel eller fixerad) skolios ses remitteras för skoliosröntgen.

Undantag: patient som har associerade sjukdomar som kontraindicerar eventuell skoliosoperation.

Fortsatt uppföljning baserat på röntgensvar:

<20 graders Cobbvinkel

Fortsatt klinisk uppföljning. Ny röntgen om progress misstänks vid klinisk undersökning.

>20-40 graders Cobbvinkel

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Nyupptäckt skolios (1:a röntgen) | ny rtg om 2 år |
| Progress < 10 grader på 2 år | ny rtg om 4 år |
| Progress > 10 grader på 2 år | ny rtg om 2 år |

> 40 graders Cobbvinkel

Avgör om patienten skall remitteras för operationsbedömning

Om operation ej är aktuellt nu, men eventuellt i framtiden:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Nyupptäckt skolios (1:a röntgen) | ny rtg om 1 år |
| Progress < 10 grader på 2 år | ny rtg om 2 år |
| Progress > 10 grader på 2 år | ny rtg om 1 år |